

Mák setý v ekologickém zemědělství

Přes značnou kulinařskou oblibu a mimořádný zájem trhu doznaly plochy máku setého v ČR meziročně pokles o více než 42 procent, v letošním roce to bylo 18 300 hektarů, zatímco v roce 2011 bylo mákem oseto 31 500 hektarů. Výměry máku se tak vrátily do let 2002 až 2003. Strmý pád ploch konvenčně pěstovaného máku ovšem vynikne, srovnáme-li konečný letošní výsledek s rokem 2008, kdy plochy máku kulminovaly na oseté ploše 69 600 hektarů. Pokles ploch tak činí téměř 74 procent. Bohužel, v ekologickém zemědělství zůstává mák marginální plodinou.

Jednou z příčin poklesu pěstování máku u nás je neexistence právní ochrany původu makového semene. Dovozy a překupníci tak mohou významně vydělat díky tomu, že do kvalitního českého máku přimíchávají technický mák, zhoršující kvalitu semen nejen z organoleptického hlediska. Technický mák totiž pochází z vysokomorfino-

ochranné značky pro český mák, osvědčující originalitu výrobku, ekologičtí zemědělci svou ochrannou známku – certifikát, dávno mají. Co ovšem nemají, je mák, který by mohli ve větším množství výhodně zpeněžit, vždyť i přes veškeré meziroční výkyvy cen konvenčního máku bylo možné prodávat ekologický mák za 100 Kč/kg u pěstí-

máku nastal, když se podařilo najít herbicidy a způsoby ošetření, které mimořádně citlivé rostliny máku fatálně nepoškodí a současně eliminují plevelnou konkurenci.

Ekologické zemědělství se podobných zásahů dobrovolně zříká, mnozí dosud neobjevili, či spíše z nedostatku času nerealizují, účinné postupy s využitím

kteřý v obchodě s biopotravinami zájemce zaplatí v přepočtu více než 300 Kč/kg (70 až 80 Kč/250 g), ke škodě českého spotřebitele i ekologického zemědělce.

Stručná srovnání

Podle šetření Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) bylo u nás v roce 2011 ekologicky obhospodařováno celkem 460 498 ha zemědělské půdy. Výměra orné půdy činila 58 760 ha, 394 440 ha TTP (85,7 %) a zbylých 7298 ha představovaly trvalé kultury (1,6 %).

Na orné půdě v ekologickém a konvenčním zemědělství je značný rozdíl mezi zastoupením důležitých skupin pěstovaných plodin. Zatímco v ekologickém systému převažují pícniny (43 %) následované obilninami (41 %), pak v konvenčním systému tvoří obilniny nejvýznamnější skupinu pěstovaných plodin (59 %) a zastoupení olejnin (15 %) je skoro stejně tak velké jako pícnin na orné půdě (17 %). V ekologickém zemědělství však tvoří zastoupení olejnin na orné půdě pouze necelá čtyři procenta. Je to dáno odlišnou strukturou této formy hospodaření vyplývající z dosažené míry podpory, která snižuje závislost na zisku a umožňuje ekologicky hospodařícím vyšší diverzitu činností, která je rovněž časově náročná.


Ekologicky pěstované olejliny na 2319 ha (rok 2011) orné půdy jsou svým podílem specifické a poptávka po nich je vytrvalá. Přes nárůst zastoupení ploch řepky a řepice se v ekologickém režimu dlouhodobě daří hořčici, jejíž výnosy jsou stabilní, v průměru asi o deset procent nižší než v konvenčním zemědělství. O výnosech ekologicky pěstované řepky totéž konstatovat nelze.

Plochy ekologického máku tvoří pouhý zlomek celkové výměry olejnin a nedosahovaly v roce 2011 ani jednoprocenního zastoupení. Zatímco, podle údajů Hrabalové a kol. (2011), dosáhl v roce 2010 ekologický mák výnosu 1,22 t/ha, pak v roce 2011 byla situace jiná a ekologický mák zaznamenal pouze 70 % výnosu máku konvenčního (0,6 ku 0,85 t/ha).

Za daného stavu věcí, tedy při stále poptávce a minimální produkci olejnatých semen, je ekologická produkce máku zajímavá pro všechny zúčastněné. Potíž ovšem je, že při dodržování pravidel ekologické produkce je primárním faktorem ročník, mimořádně důležitým faktorem výběr odrůdy, a v závislosti na přírodních podmínkách a průběhu počasí je pak alfou a omegou perfektně zvládnutá agrotechnika, od osevního postupu až po efektivní regulaci plevelů.

Jak na pěstování máku v ekozemědělství

Od roku 2005 spolupracujeme na pokusech s ekologickým pěstováním máku s ekologickým zemědělcem a současně zakládáme, vedeme a vyhodnocuje-



me pokusy na výzkumných stanicích České zemědělské univerzity v Praze (Uhrňetves, Červený Újezd). Poznatky z pokusné práce doplňují známé skutečnosti, které pro stručnost shrneme v tabulce.

Z výsledků našich pokusů vyplývá vhodnost využití ošetření osiv, půdy i rostlin (podle doporučení výrobce) přípravky Polyversum, Supresivit a Gliorex. Tyto přípravky se osvědčily i bě-

ranější jarní odrůdy máku v blízkosti hlavní plochy jarního máku, což se nám dva roky po sobě vyplatilo ve vztahu k výnosu. Bylo pouze třeba zvládnout napadení krytonoscem kořenovým. Klíčovým faktorem úspěšného pěstování máku v ekologickém zemědělství je zvládnutí regulace plevelů.

Ekologické zemědělství trpí trvalým nedostatkem semen olejnatých plodin a ještě více ne-

Zastoupení druhů (výměra a výnosy) ve skupině ekologicky a konvenčně pěstovaných olejnin (2011)

| Pěstování Plodiny | Ekologické | | Konvenční | | EZ/KZ výměra (%) | EZ/KZ výnos (%) |
|----------------------------|------------|-------|-----------|-------|------------------|-----------------|
| | ha | t/ha | ha | t/ha | | |
| Orná půda celkem | 58 759,83 | n. a. | 2 488 141 | n. a. | 2,4 | x |
| Olejny celkem | 2 319,31 | 0,69 | 464 405 | 1,63 | 0,5 | 42,3 |
| Slunečnice | 113,47 | 1,75 | 28 554 | 2,48 | 0,4 | 70,6 |
| Sója | 27,03 | 2,03 | 7 584 | 2,36 | 0,4 | 86,0 |
| Řepka a řepice* | 773,22 | 1,31 | 373 386 | 2,80 | 0,2 | 46,8 |
| Len (setý olejny – semeno) | 14,49 | 1,45 | 2 475 | 1,39 | 0,6 | 104,3 |
| Mák | 9,77 | 0,60 | 31 495 | 0,85 | 0,0 | 70,6 |
| Hořčice | 711,43 | 0,84 | 18 122 | 0,93 | 4,9 | 90,3 |
| Ostatní olejny | 669,90 | 0,33 | 2 789 | 0,59 | 24,0 | 55,9 |

Zdroj: Hrabalová, ČSÚ (2012)

* Výnos řepky – orientačně použit údaj z roku 2010, pro rok 2011 není uveden

vých odrůd, pěstovaných pro farmaceutické účely a jeho přimíchávání zvyšuje obsah morfinu v produktu. Skrytější a synergicky působící příčinou byla konkurence mezi pěstiteli a nárůst ploch, který posléze rovněž mohl vést ke snížení výkupních cen, což přispělo k šíření podvodných praktik.

Zatímco pro konvenční pěstitele je nadějí tvorba a registrace

tele. O této ceně se konvenčnímu pěstiteli může jen zdát, i když v roce 2008 prodával za 70 Kč/kg a aktuální cena činí 43 Kč/kg.

Maková semena jsou oblíbená, mák však mezi ekologickými pěstiteli již tolik oblíben není, protože je plodinou mimořádně obtížnou, zvláště pokud jde o zvládnutí plevelů. Koneckonců, růst s plochami konvenčního

dostupné mechanizace a agrotechniky, a tak jsou plevele a nízká konkurenceschopnost máku hlavními důvody, proč je českými ekologickými pěstiteli pěstován pouze na malých plochách, které lze zvládnout ručně. Produkce pak slouží pouze ke krytí potřeb rodiny, maximálně úzkého okruhu známých. Je to škoda, protože do ČR je dovážěn ekologický mák z Turecka, za

Stručný přehled pěstitelské technologie máku pro ekologické zemědělství

| | |
|----------------------------|--|
| Produkční faktory | Podle výrobních podmínek. Z dlouhodobého hlediska jsou nejvyšší výnosy máku v bramborářské výrobní oblasti. V teplejších oblastech problémy s teplotními škůdci (a chorobami). Při ruční regulaci plevelů a ruční sklizni činí max. zvládnutelná plocha do 0,5 ha. Podmínkou snaha využít dostupnou mechanizaci. |
| Výběr pozemku | Možnost vláčení, plečkování, úrodné, hlubší a strukturální půdy. |
| Zařazení v osevním postupu | Vysoké výnosy po hnojem hnojené předplodině nebo po jetelovině. V EZ méně vhodné po obilnině (zvládnutí plevelů). Časový odstup 5 let. Bez řepky v osevním postupu. Na záhumencích možné tradiční souběžné pěstování s řepou. |
| Hnojení | Při zařazení do II. nebo III. tratí možno přihnojit 30 kg N/ha před setím (hnojiva povolena v EZ). V období prodloužení stonku až poupě pak dalšími 30–40 kg N/ha. Zvýšení výnosu/rizika napadení chorobami. |
| Příprava půdy | Základní příprava: včasná podmítka, hluboká podzimní orba. Minimalizace operací v předsetové přípravě. Bez smyku a válení, pouze vláčení. Opakovaná příprava půdy jako příspěvek k regulaci plevelů. |
| Výběr odrůdy | Podle SDO (stránky ÚKZÚZ), s důrazem na odolnost, osvědčené odrůdy (zkoušet více odrůd, nutnost udělení výjimky při nákupu nemoženého konvenčního osiva). Využít existence odrůd ozimého máku. |
| Úpravy a ošetření osiv | Významné pro snížení výskytu chorob přenosných osivem. Z fyzikálních metod jsou užívány metody E-ventus, HWT. K moření osiva lze použít Polyversum či pomocný půdní přípravek Gliorex. Aktuálně nejsou známy případy ošetření osiva přípravky s insekticidním účinkem povolené v EZ. |
| Termín setí | Na jaře výsev, jakmile to půdní a vláhové poměry umožní, nejpозději do konce dubna. Na podzim mezi 10.–20. 9. Mladé rostliny snáší nízké teploty, dlouhodobé působení nízkých teplot (+ sněhová pokrývka) však mohou rostliny oslabit a přispět k vyššímu výskytu chorob. |
| Výsevek | Výsevek od 1,5 do 2 kg/ha. Vyšší při podzimním výsevu a u osiv ošetřených fyzikálně. Na rozdíl od ozimé řepky v EZ nelze doporučit zvýšení výsevu 1,5–2x (problémy s jednocením). Osvědčil se stejný, případně nižší výsevek. |
| Spon | Ne úzké řádky, široké meziřádky (minimálně 40–50 cm) souvisí s nutností mechanické regulace plevelů (v závislosti na dostupné mechanizaci), prutové brány (nepostradatelné u ekologicky pěstovaných obilnin) nejsou u máku vhodné (snad pouze v rané fázi při nutnosti "profedit" hustý porost). |
| Ochrana – škůdci | Proti krytonosci makovicovému je účinný postřik přípravkem Neem Azal ke kořenovým krčkům rostlin se 2–6 pravými listy. Přípravek je neselektivní. Výsledky pokusů naznačují dlouhodobý účinek a snížení poškození makovic larvami krytonosce makovicového. Záchytné rostliny, obsevy. V ochraně proti krytonosci makovicovému se osvědčil kvetoucí porost ozimého máku z pozdního výsevu (první dekáda října), který zachytil 99 % náletu samic krytonosce makovicového. Podobně by mohla posloužit ranější odrůda máku, případně ozimý mák z jarního výsevu ve stejném termínu. |
| Ochrana – choroby | Povoleno přípravky: www.srs.cz (s obsahem síry, mědi). Z biologických povoleno Polyversum (2–3x během vegetace). Dobré výsledky poskytl Gliorex (aplikace na půdu s dolomitickým vápencem, dražé, na menší plochy). |
| Regulace plevelů | Nepřímou osevním postupem, přímo pouze mechanicky (termicky), dokud to výška porostu dovolí. |
| Výživa | Klíčová. Před výsevem organické hnojení (není-li po organicky hnojených okopaninách), lze užít i rychle mineralizovatelná hnojiva (výpalky, fermentovaná drůbeží kejda, pěťové moučky). Pozitivní seznam: Příloha I, Hnojiva a pomocné půdní látky podle čl. 3 odst. 1NK (ES) 889/2008. |
| Sklizeň | Mechanizovaná – sklízecí mlátička nebo dělená sklizeň, případně ruční vylamování, důraz na posklizňovou úpravu (více plevelů může znamenat vyšší vlhkost sklizených semen). Vlastní osivo na přístří rok: pozitivní výběr makovic, nejlépe z podzimních výsevů (i jarního máku). |

SDO: seznam doporučených odrůd

E-ventus: ošetření elektronovým zářením, HWT: ošetření horkou vodou, obojí snižuje klíčivost, nutno navýšit výsevek



Pás ozimého máku z pozdního výsevu (jediný nepřivalený po výsevu) ochránil jarní mák před napadením krytonoscem makovicovým (Budyně nad Ohří 2010)
Foto Perla Kuchtová

hem vegetace. Osvědčila se také kombinace fyzikálního ošetření osiva (E-ventus) a přípravky Supresivit nebo Polyversum.

Přímá ochrana proti krytonosci je možná s užitím přípravku Neem Azal, Spruzit totiž vykazuje v doporučené koncentraci minimální a krátkodobý účinek na cílový organismus. K nepřímé ochraně proti náletům krytonosce makovicového je možné využít pás ozimé (možná

dostatkem osiv, která jsou, až na výjimky, u většiny skupin plodin nedostupná, a tak by zajímavým podnikatelským záměrem mohla být produkce osiv máku pro ekologické zemědělství.

(Článek vznikl díky finanční podpoře NAZV QH 92106 - Pěstitelské systémy u máku se zaměřením na kvalitu a bezpečnost ekologické a integrované produkce).

Ing. Perla Kuchtová, Ph.D

Ing. Perla Kuchtová, Ph.D, působí na katedře rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze od roku 1992. Podílela se např. na výzkumu tvorby výnosů řepky v EZ a je mimo jiné také odpovědnou řešitelkou grantu NAZV QH 92106: Pěstitelské systémy u máku se zaměřením na kvalitu a bezpečnost ekologické a integrované produkce. Neopomenutelnou součástí její činnosti je výuka ekologického zemědělství v několika předmětech.

